AVRIL 2014 - PRIX HORS TVA - PROMOTIONS VALABLES DU 28/04/2014 AU 15/07/2014
SEPTODONT NV-SA - AVENUE DE LA CONSTITUTION 87 - B-1083 BRUXELLES - **WWW.SEPTODONT.BE**

septodont promo nr10

NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR PRÉVENIR LES PIQÛRES ACCIDENTELLES?

RESTEZ COUVERT

Effectuez votre injection en toute sécurité p.9
Découvrez nos solutions

NOUVEAU p.10-11
Gamme complète pour toutes vos préparations gingivales

R.T.R.® p.21
Évitez une perte de volume osseux après extraction

septodont

Editorial

Tom Preneel
General Manager
Septodont BENELUX

Cher client,

Vous avez bien lu : notre Septodont INFO s'est métamorphosé en un Septodont PROMO. Dorénavant, vous recevrez deux fois par an une édition INFO plus détaillée avec des témoignages de dentistes, des articles intéressants combinés avec d'importantes promotions, qui alterne maintenant avec une édition PROMO plus aérée. L'édition PROMO contient des promotions sur une large gamme de produits Septodont. Des produits qui contribuent à une pratique plus sûre et plus efficace et des produits qui méritent d'être mis en avant.

Dans cette édition :
En page 9 : vous trouverez toutes nos promotions pour injecter de manière sécurisée.
NOUVEAU En pages 10-11 nous vous présentons Racecord Caps : une pâte de rétraction gingivale qui complète notre gamme de matériau pour la préparation gingivale. Quelle que soit la solution pour laquelle vous optez (pâte, gel, éventuellement en combinaison avec des fils de rétraction), nous avons la solution pour vous. En page 21, nous mettons à nouveau le R.T.R.® en avant, avec les cônes de R.T.R.® vous évitez très facilement la perte de volume osseuse après extraction.
Refermez le PROMO et jetez un coup d'œil à la couverture arrière, car vous y trouverez 4 top-promotions réunies.

Il y en a pour tous les goûts… feuilletez vite les promotions et profitez des offres.

Effectuez votre procédure anesthésique avec confiance

Le saviez-vous ?

- Septanest®, est la première marque de Septodont, leader mondial de l'anesthésie dentaire(1), qui produit plus de 500 millions de cartouches chaque année.
- Chaque seconde, 4 injections sont réalisées avec Septanest® de par le monde.
- Septanest® est approuvé et enregistré par 70(2) Autorités de Santé.
- La fabrication de Septanest® inclut une étape de "Stérilisation Terminale", méthode de référence pour les Autorités de Santé car la "Stérilisation Terminale" apporte le plus haut niveau d'assurance de stérilisation.
- Une cartouche de Septanest® est 100% sans latex mais en plus le produit n'entre jamais en contact avec celui-ci lors de la production.
- En plus des 27 contrôles qualité classiques, chaque cartouche fait l'objet d'une inspection visuelle avant sa commercialisation.

Mais saviez-vous que
Septanest® a un taux d'acidité moins élevé, donc un pH plus élevé (pH de 4.0 à 5.5) en comparaison avec les formules équivalentes sur le marché. Un taux de pH plus élevé sera à la base d'une anesthésie qui prend plus vite et une injection moins douloureuse.(3)(4)

(1) Septodont est la seule société à produire 500 millions de cartouches dentaires par an.
(2) Dans certains pays, Septanest est commercialisé sous le nom de Septocaine® ou Medicaine®
(3) Faster Onset and More Comfortable Injection with Alkalinized 2% Lidocaine with Epinephrine 1:100,000 Stanley F. Malamed, DDS; Susan Tavana, DDS; and Mic Falkel, DDS - Compedium Feb 2013
(4) Buffering Local Anesthetics in Dentistry Stanley F. Malamed, DDS - Compedium April 2011

focus

Info
7 Anesthésie de contact : Pourquoi opter pour un spray, des pellets ou un gel ?
18 Isodan : Agent de désensibilisation pour le traitement de l'hyperesthésie dentinaire
21 R.T.R.® : Evitez la perte de volume osseux après extraction

Promotions
9 Des solutions pour prévenir les piqûres accidentelles
10-11 Gamme complète de matériaux pour la préparation gingivale

Les Super Promos
13 N'Durance Dimer Core
15 Produits Endo
22 Produits Désinfection
24 Hexidis Plus

Chez Septodont dans les coulisses

500 millions de carpules par an, lesquelles satisfont pièce par pièce aux normes de qualité les plus élevées : cela ne peut qu'être le résultat d'un processus de fabrication de haute technologie. Mais les images en disent plus long que les mots. C'est pourquoi nous avons réalisé un petit film mettant un coup de projecteur dans les coulisses de notre production.

Dorénavant, vous pouvez ainsi voir de vos propres yeux ce qui rend nos anesthésiques locaux aussi particulier. Depuis la préparation pharmaceutique de la solution, la pré-stérilisation et le remplissage en deux phases des carpules jusqu'au scellement et à l'emballage : toutes les procédures sont mises en images et expliquées.

100% de professionnalisme, une production et des produits 100% sans latex, une stérilisation finale complète, 27 contrôles de qualité enregistrés et une inspection visuelle de chaque carpule : ce ne sont que quelques éléments qui contribuent aux propriétés de nos anesthésiques locaux.

Découvrez par vous-même les procédures de production en scannant le code QR ou allez sur la chaîne YouTube Septodont Belgique.

Septodont on YouTube

SEPTANEST NORMAL

Articaïne 4% - Adrenaline 1/200.000.

Cartouches 1,8 ml

€32,00

Boîte de 50 cartouches de 1,8 ml

Chlorydrate d'articaïne 72,000 mg - Adrénaline 0,009 mg

Anesthésie locale ou loco-régionale dans les cabinets odonto-stomatologiques

Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 10 cartouches

Réf. 3914R

Demandez nos offres spéciales

SEPTANEST SPECIAL

Articaïne 4% - Adrénaline 1/100.000.

Cartouches 1,8 ml

€32,00

Boîte de 50 cartouches de 1,8 ml

Chlorydrate d'articaïne 72,000 mg - Adrénaline 0,018 mg

Anesthésie locale ou loco-régionale dans les cabinets odonto-stomatologiques

Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 10 cartouches

Réf. 3879I

DENOMINATION DU MEDICAMENT :
SEPTANEST NORMAL, 40 mg/ml + 5 microgram/ml, solution injectable
SEPTANEST SPECIAL, 40 mg/ml + 10 microgram/ml, solution injectable

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
SEPTANEST NORMAL
Pour une cartouche de 1 ml : Chlorhydrate d'articaïne 40,000 mg ; Adrénaline 0,0050 mg sous forme de tartrate d'adrénaline. Une cartouche de 1 ml contient 40,000 mg de chlorhydrate d'articaïne et 0,0050 mg d'adrénaline. Une cartouche de 1,8 ml contient 72,000 mg de chlorhydrate d'articaïne et 0,009 mg d'adrénaline. Excipients : Chlorure de sodium, métabisulfite de sodium, édétate de sodium, solution d'hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

SEPTANEST SPECIAL
Pour une cartouche de 1 ml : Chlorhydrate d'articaïne 40,000 mg ; Adrénaline 0,010 mg sous forme de tartrate d'adrénaline. Une cartouche de 1 ml contient 40,000 mg de chlorhydrate d'articaïne et 0,010 mg d'adrénaline. Une cartouche de 1,8 ml contient 72,000 mg de chlorhydrate d'articaïne et 0,018 mg d'adrénaline. Excipients : Chlorure de sodium, métabisulfite de sodium, édétate de sodium, solution d'hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

FORME PHARMACEUTIQUE
Solution injectable.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Anesthésie locale ou loco-régionale en pratique odonto-stomatologique.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 4 ans en raison du type d'anesthésie non adapté avant cet âge.

Posologie
Adulte : Pour la plupart des interventions courantes, une infiltration de 1,8 ml est suffisante. Dans tous les cas, l'injection devra être faite lentement (1 ml/min environ). Ne pas dépasser la dose de 7 mg de chlorhydrate d'articaïne par kilogramme de poids corporel.

Enfant (de plus de 4 ans) : La quantité injectée dépend de l'âge, du poids de l'enfant et du type d'intervention à réaliser.

TABLEAU 1 :
POSOLOGIE DU SEPTANEST NORMAL/SPECIAL CHEZ L'ENFANT

POIDS DE L'ENFANT		20 kg	30 kg	40 kg
Dose maximale : 0,18 ml/kg		3,6 ml 2 cartouches	5,4 ml 3 cartouches	7,2 ml 4 cartouches
Dose moyenne recommandée en cartouche de 1,8 ml	Procédure simple 0,06 ml/kg	1,2 ml 2/3 d'une cartouche	1,8 ml 1 cartouche	2,4 ml 1,3 cartouche
	Procédure complexe 0,07 ml/kg	1,4 ml 3/4 d'une cartouche	2,1 ml 1,2 cartouche	1,5 ml 1,5 cartouche

Sujet âgé
Réduction de moitié de la dose réservée à l'adulte.

Mode d'administration
INJECTION LOCALE OU REGIONALE INTRA-BUCCALE SOUS-MUQUEUSE.
Vérifier qu'il n'y a pas d'effraction vasculaire par des tests d'aspiration répétés, en particulier lors d'anesthésie régionale (tronculaire). La vitesse d'injection ne doit pas dépasser 1 ml de solution par minute.

CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à l'articaïne ou à des anesthésiques locaux similaires et à l'un des excipients de la préparation - Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire sévères et non appareillés - Epilepsie non contrôlée par un traitement - Insuffisance hépatique grave - Porphyrie - Enfant âgé de moins de 4 ans - Affections cardiovasculaires : graves (telles que l'infarctus du myocarde récent) ; troubles du rythme ; arythmie ; maladies cardiaques et ischémiques ; hypertension - Thyréotoxicose - Diabète sévère - Patients sous inhibiteurs de la mono-amino-oxydase ou antidépresseurs tricycliques et patients présentant une myasthénie grave et un taux de cholinestérase peu élevé (contre-indication relative) - Injection intravasculaire.

EFFETS INDESIRABLES
L'articaïne et l'adrénaline peuvent atteindre des concentrations sanguines suffisamment élevées pour entraîner des effets indésirables systémiques. Les effets indésirables sont listés ci-dessous par classe organe et par fréquence (classification MedDRA). Les fréquences sont définies selon les catégories suivantes : Fréquent : ≥ 1/100 et < 1/10 ; Peu fréquent : ≥ 1/1 000 et < 1/100 ; Rare : ≥ 1/10 000 et < 1/1 000. *Affections du système immunitaire :* Rare : réactions allergiques et de façon plus sérieuse, choc anaphylactique ; *Affections psychiatriques :* Rare : nervosité, anxiété ; *Affections du système nerveux :* Fréquent : céphalées, paresthésies, hypoesthésies ; Rare : paralysie faciale, épilepsie, vertiges, agitation, désorientation, tremblements ; *Affections oculaires :* Rare : diplopie, mydriase, ptosis, myosis, enophtalmie ; *Affections cardiaques :* Fréquent : bradycardie, tachycardie ; Rare : défaillance cardiovasculaire et arrêt cardiaque ; *Affections gastro-intestinales :* Peu fréquent : nausées, vomissements, diarrhée ; *Affections de la peau et du tissu sous-cutané :* Fréquent : oedème facial ; Peu fréquent : prurit ; Rare : angiœdème, nécrose tissulaire ; *Affections vasculaires :* Fréquent : chute de la pression artérielle ; Peu fréquent : élévation de la pression artérielle.

Une prolongation de l'interruption de la transmission de l'influx nerveux (effet pharmacologique du produit) peut être observée après l'administration d'articaïne. La disparition des symptômes sensitifs se fait habituellement en huit semaines.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT NV-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel

NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTANEST NORMAL : BE 152765 SEPTANEST SPECIAL : BE 152661

MODE DE DELIVRANCE
Médicaments soumis à prescription médicale

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE
06/2011

L'Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, la distribution de médicaments s'effectue exclusivement via les pharmacies d'officines (AFMPS).

SCANDONEST 2% SPECIAL

€32,00

Mépivacaïne 2% - Adrénaline 1/100.000 (EPINEPHRINE).

Cartouches 1,8 ml

Boîte de 50 cartouches de 1,8 ml

Chlorhydrate de mépivacaïne 36,000 mg - Adrénaline 0,0018 mg

Anesthésie locale pour usage en stomatologie ou dentisterie

Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 10 cartouches

Réf. 3726L

DENOMINATION DU PRODUIT
SCANDONEST 2% spécial, solution injectable

COMPOSITION
Quantité par cartouche de 1,8 ml Chlorhydrate de mépivacaïne 36,00 mg Adrénaline 18,00 µg
Excipients : Chlorure de sodium, métabisulfite de potassium, édétate de sodium, eau pour préparations injectables.

FORME, VOIES D'ADMINISTRATION ET CONDITIONNEMENT.
Solution injectable.
Anasthésique local à usage stomatologique et dentaire. Cartouches de 1,80 ml.
Blister de 10 cartouches / boîtes de 5 plaquettes.

INDICATIONS
Anesthésique locale pour usage stomatologique et dentaire. Toutes anesthésies d'infiltration et de conduction, sauf tronculaires puisque l'anesthésique contient un vasoconstricteur.
Peut être utilisé comme anesthésique de surface des muqueuses : un badigeonnage avec la solution injectable supprime la douleur de la piqûre et le réflexe pharyngien.
Ce produit peut être utilisé dans toutes les interventions de routine. Il est employé chez les sujets pour lesquels la noradrénaline est contre-indiquée (décision du choix avec les anesthésiques locaux injectables, à base de mépivacaïne, noradrénalinés).

POSOLOGIES ET MODE D'EMPLOI
Pour un maximum d'efficacité et pour le confort du malade, il est conseillé de faire tiédir la solution anesthésique et de procéder à une injection lente (ne pas dépasser 0,5 ml/15 sec soit une cartouche par minute).Pour les adultes La dose moyenne à injecter sera d'une demi-cartouche pour les interventions courantes ; pour les interventions longues et difficiles, cette dose pourra atteindre une cartouche et demie, voire 2 cartouches.Pour les enfants De 4 à 15 ans, on tiendra compte du poids. La dose moyenne à prévoir est de 0,5 mg/kg : en aucun cas la dose totale ne dépassera 1 cartouche par séance.De façon à éviter l'injection intravasculaire,aspirer systématiquement avant toute injection pour s'assurer que la pointe de l'aiguille n'est pas dans la lumière d'un vaisseau.

CONTRE-INDICATIONS
Allergies connue aux anesthésiques locaux du même groupe chimique et à l'un ou plusieurs des agents conservateurs. Anesthésies tronculaires. *Contre-indications dues au chlorhydrate de mépivacaïne* - myasthénie grave - tout plasmatique bas en cholinestérases. *Contre-indications dues à l'adrénaline* - affections cardio-vasculaires : arythmie, pathologie cardiaque et ischémique, hypertension - thyréotoxicose - diabète sérieux - patients traités par I.M.A.O. ou des antidépresseurs tricycliques. *Remarque :* Les territoires dotés d'une circulation terminale, tels que les doigt, les orteils, le nez, les oreilles et le penis, ne peuvent pas être anesthésiés avec ce produit en raison de la présence du vasoconstricteur.

EFFETS INDESIRABLES
Les risques d'hypersensibilité dus aux anesthésiques locaux à fonction amide sont rares.
Effets indésirables dus au chlorhydrate de mépivacaïne. Certains troubles cardiovasculaires peuvent intervenir lors d'une administration massive de produit : hypertension, bradycardie, collapsus cardiovasculaire et arrêt cardiaque de même que certains troubles nerveux : céphalées, vertiges, acouphène, nausées et vomissements, tremor, somnolence, perte de connaissance, convulsions et arrêt respiratoire. Il est recommandé d'utiliser ces produits avec précaution chez les sujets sensibilisés, ou présentant une insuffisance hépatique, et/ou atteints d'acidose ou d'épilepsie. *Effets indésirables dus à l'adrénaline* - Les effets indésirables les plus importants pouvant survenir après l'administration de ce vasoconstricteur sont : - hypertension, arythmie, angor, vasoconstriction généralisée, agitation et palpitations. - Les sujets à risque sont ceux présentant une affection cardio-vasculaire et ceux atteints de thyréotoxicose

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT S.A. - Avenue de la Constitution 87 - 1083 Bruxelles

NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 1033 IS 18 F 12

NCE Produit exclusivement réservé à l'usage professionnel en odontostomatologie.
MISE À JOUR DE LA NOTICE Novembre 2006

SCANDONEST 3%

€32,00

Mépivacaïne 3% - sans vasoconstricteur.

Cartouches 1,8 ml

Boîte de 50 cartouches de 1,8 ml

Chlorhydrate de mépivacaïne 54,000 mg

Anesthésie locale pour usage en stomatologie ou dentisterie

Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 10 cartouches

Réf. 3438J

DENOMINATION DU MEDICAMENT
SCANDONEST 3 % SANS VASOCONSTRICTEUR, solution injectable

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
1 ml de solution injectable contient 30,00 mg de chlorhydrate de mépivacaïne. Une cartouche de 1,8 ml contient 54,00 mg de chlorhydrate de mépivacaïne. Excipients : Chlorure de sodium, solution d'hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

FORME PHARMACEUTIQUE Solution injectable. Solution limpide et incolore.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Anesthésie locale et régionale (tronculaire) pour usage stomatologique et dentaire. Recommandé d'une manière générale chez tous les patients pour les interventions courantes. Peut être utilisé comme anesthésique de surface des muqueuses : un badigeonnage avec la solution injectable supprime la douleur de la piqûre et le réflexe pharyngien. Cet anesthésique sera également choisi pour tous les sujets chez lesquels un vasoconstricteur est contre-indiqué.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie Pour un maximum d'efficacité et pour le confort du malade, il est conseillé de faire tiédir la solution anesthésique et de procéder à une injection lente (ne pas dépasser 0,5 ml/15 sec soit une cartouche par minute). Pour les adultes : La dose moyenne à injecter sera d'une demi-cartouche pour les interventions courantes; pour les interventions longues et difficiles, cette dose pourra atteindre une cartouche et demie, avec un maximum de deux cartouches. Population pédiatrique : Enfants de 4 ans (poids corporel d'environ 20 kg) et plus (voir section "CONTRE-INDICATIONS".) *Dose thérapeutique recommandée :* La quantité à injecter doit être déterminée en fonction de l'âge et du poids de l'enfant, et de l'ampleur de l'intervention à réaliser. La dose moyenne est de 0,75 mg/kg = 0.025ml de solution de mépivacaïne par kg de poids corporel. *Dose maximale recommandée :* Ne pas dépasser l'équivalent de 3 mg de mépivacaïne / kg (0.1ml de mépivacaïne / kg) de poids corporel.

Mode d'administration De façon à éviter l'injection intravasculaire, aspirer systématiquement avant toute injection pour s'assurer que la pointe de l'aiguille n'est pas dans la lumière d'un vaisseau.

CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité aux anesthésiques locaux à fonction amide ou à l'un des excipients de la préparation. - patient avec antécédent d'hyperthermie maligne; - troubles de la conduction auriculo-ventriculaire sévères et non appareillés; - épilepsie non contrôlée par un traitement; - porphyrie aigüe intermittente; enfant de moins de 4 ans (poids corporel d'environ 20 kg).

EFFETS INDESIRABLES
Comme avec tous les anesthésiques utilisés en odontostomatologie, des lipothymies peuvent survenir. En cas de surdosage ou chez certains patients prédisposés, les signes cliniques suivants peuvent être observés : - sur le système nerveux central : nervosité, agitation, bâillement, tremblements, appréhension, nystagmus, logorrhées, céphalées, nausées, bourdonnements d'oreille. Ces signes d'appel nécessitent de demander au patient d'hyperventiler, ainsi qu'une surveillance attentive pour prévenir une éventuelle aggravation avec convulsions puis dépression du SNC; - sur le système respiratoire : tachypnée puis bradypnée pouvant conduire à une apnée; - sur le système cardiovasculaire : tachycardie, bradycardie, dépression cardio-vasculaire avec hypotension artérielle pouvant aboutir à un collapsus, troubles du rythme (extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire), trouble de la conduction (bloc auriculo-ventriculaire). Ces manifestations cardiaques peuvent conduire à un arrêt cardiaque.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT NV-SA, Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Brussel / Bruxelles / Brüssel

NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE 035944

STATUT LEGAL DE DELIVRANCE
Médicament soumis à prescription médicale.

DATE DE DERNIERE MISE A JOUR mai 2011

DATE D'APPROBATION 12/2011

Demandez nos offres spéciales

L'Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, la distribution de médicaments s'effectue exclusivement via les pharmacies d'officines (AFMPS).
Scandonest 2% SPECIAL : temporairement non-disponible au Grand-duché du Luxembourg

LIGNOSPAN 2%

€32,00

Lidocaïne 2% - Adrénaline 1/80.000 (EPINEPHRINE).

Cartouches 1,8 ml

Demandez nos offres spéciales

Boîte de 50 cartouches de 1,8 ml

Chlorhydrate de lidocaïne 36,000 mg - Adrénaline 0,0225 mg

Anesthésie locale pour usage en stomatologie ou dentisterie

Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 10 cartouches

Réf. 3406D

DENOMINATION DU MEDICAMENT
LIGNOSPAN 1/80 000 ème épinéphrine, solution injectable.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE (exprimé en chlorhydrate de lidocaïne anhydre)	36,0000 mg
TARTRATE D'EPINEPHRINE exprimé en base	0,0225 mg
Chlorure de sodium	11,7000 mg
Métabisulfite de potassium	2,1600 mg
Edétate de sodium	0,4500 mg
Solution d'hydroxyde de sodium à 35% (m/m) q.s.p	pH 4,8 - 5,2
Eau pour préparations injectables q.s.p	1,8 ml

Quantité pour une cartouche de 1,8 ml

FORME PHARMACEUTIQUE
Solution injectable.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Anesthésie locale pour usage stomatologique et dentaire. Anesthésie d'infiltration et anesthésie de conduction. Peut être utilisé comme anesthésique de surface des muqueuses: un badigeonnage avec la solution injectable supprime la douleur de la piqûre et le réflexe pharyngien. LIGNOSPAN est utilisé dans toutes les interventions de routine. Il est à utiliser chez les sujets pour lesquels la noradrénaline est contre-indiquée. LIGNOSPAN est indiqué chez l'adulte, l'enfant et l'adolescent.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
LIGNOSPAN est indiqué chez l'adulte et l'enfant.
Posologie Adultes: La quantité à injecter sera adaptée en fonction de l'importance de l'intervention. En règle générale, une cartouche est suffisante; pour des interventions plus longues, 2 à 3 cartouches peuvent être utilisées. Ne pas dépasser 300 mg (# 4,5 mg/kg) de chlorhydrate de lidocaïne par séance. Enfant: Une attention particulière doit être portée lorsque le traitement est réalisé chez l'enfant de moins de 4 ans. La quantité à injecter dépend de l'âge, du poids de l'enfant ainsi que du type d'intervention à réaliser. La technique d'anesthésie doit être sélectionnée avec soin. Les techniques douloureuses d'anesthésie doivent être évitées. Le comportement de l'enfant pendant le traitement doit être surveillé attentivement. La dose moyenne à utiliser est de 20 à 30 mg de chlorhydrate de lidocaïne par séance. La dose en mg de chlorhydrate de lidocaïne que l'on peut administrer chez l'enfant peut également être calculée comme suit: poids de l'enfant (en kilogramme) x 1,33. Ne pas dépasser la dose de 5 mg de chlorhydrate de lidocaïne par kilogramme de poids corporel.
Sujet âgé: Réduction de moitié de la dose réservée à l'adulte. La lidocaïne est métabolisée par le foie. Réduire les doses chez les patients avec insuffisance hépatique sévère. Réduire les doses en cas d'hypoxie, d'hyperkaliémie ou d'acidose métabolique.
Méthode d'administration Injection locale ou régionale intra-buccale sous muqueuse. Des réactions toxiques peuvent être associées aux injections intravasculaires accidentelles. Vérifier qu'il n'y a pas d'effraction vasculaire par des tests d'aspiration répétés, en particulier lors d'anesthésie loco-régionale (tronculaire).La vitesse d'injection ne doit pas dépasser 1 ml/minute. LIGNOSPAN ne doit pas être mélangé avec d'autres préparations injectables.

CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament, - Patients connus pour hypersensibilité aux sulfites, - Epilepsie non contrôlée, - Hypertension grave non contrôlée ou maladie coronarienne évolutive, - Patients traités par la guanéthidine et médicaments apparentés, - Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire graves et non appareillés, - Porphyrie aiguë intermittente, - Troubles cardiovasculaires : arythmies, ischémie, hypertension, - Thyréotoxicose, - Diabète grave, - Patients soumis à des traitements généraux par les I.M.A.O. ou les antidépresseurs tricycliques,
Remarques : les territoires dotés d'une circulation terminale, tels que les doigts, les orteils, le nez, les oreilles et le pénis ne peuvent être anesthésiés avec l'un de ces deux produits étant donné la présence du vasoconstricteur.

EFFETS INDESIRABLES
Les risques d'hypersensibilité dus aux anesthésiques locaux à fonction amide sont rares. - Comme avec tous les anesthésiques utilisés en odontostomatologie, des lipothymies peuvent survenir. - Ce produit contient des sulfites qui peuvent entraîner ou aggraver des réactions anaphylactiques (risque de bronchoconstriction sévère). Il est recommandé d'utiliser ces produits avec précaution chez les sujets sensibilisés ou présentant une insuffisance hépatique et/ou atteints d'acidose ou d'épilepsie.
En cas de surdosage ou chez certains patients prédisposés, les signes cliniques suivants peuvent être observés :
- *sur le système nerveux central (SNC)*: nervosité, agitation, bâillements, tremblements, appréhension, nystagmus, logorrhée, céphalées, nausées, bourdonnements d'oreille, ataxie, hyperesthésie, paresthésie. Ces signes d'appel nécessitent de demander au patient d'hyperventiler, ainsi qu'une surveillance attentive pour prévenir une éventuelle aggravation avec convulsions puis dépression du SNC. - *sur le système respiratoire*: tachypnée puis bradypnée, pouvant conduire à une apnée. - *sur le système cardiovasculaire*: tachycardie, bradycardie, dépression cardio-vasculaire avec hypotension artérielle pouvant aboutir à un collapsus, troubles du rythme (extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire), trouble de la conduction (bloc auriculo-ventriculaire), hypertension, palpitation, pâleur. Ces manifestations cardiaques peuvent conduire à un arrêt cardiaque. - *sur l'état général*: asthénie, œdème facial, maux de tête, infection, allergie. - *sur le système digestif*: gingivite, douleurs dentaires. - *sur le système musculaire*: tétanie. - *sur le système sensoriel*: amblyopie.
Chaque fois qu'un anesthésique local est utilisé, un équipement de réanimation, d'oxygène, de benzodiazépine et de médicaments pour traiter les réactions anaphylactiques doit être disponible.
-> Effets indésirables dus à l'épinéphrine
Les effets indésirables les plus importants pouvant survenir après l'administration de ce vasoconstricteur sont: - anxiété, tension, agitation, maux de tête, tremblements, faiblesse, vertige, pâleur, difficultés respiratoires et palpitations. Les sujets à risque sont ceux présentant des troubles du rythme cardiaque (arythmies).

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT SA, 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Bruxelles

NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
BE160352

STATUT LEGAL DE DELIVRANCE
Médicament soumis à prescription médicale.

DATE D'APPROBATION
06/2013

XYLONOR NORADRENALINE

€32,00

Lidocaïne 3% - Noradrénaline 1/25.000 (NOREPINEPHRINE).

Cartouches 1,8 ml

Boîte de 50 cartouches de 1,8 ml

Chlorhydrate de lidocaïne 57,618 mg - Noradrénaline 0,072 mg

Anesthésie locale pour usage en stomatologie ou dentisterie

Cartouches 100% exemptes de latex, stérilisation finale, sachets blister de 10 cartouches

Réf. 4150T

DENOMINATION DU MEDICAMENT
Xylonor Noradrénaline, 30 mg/ml+0,04 mg/ml, solution injectable

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
1 ml de solution contient 30 mg de chlorhydrate de lidocaïne anhydre (équivalent à 32,01 mg de chlorhydrate de lidocaïne) et 0,04 mg de noradrénaline (équivalent à 0,08 mg de tartrate de noradrénaline).
Excipients : Chlorure de sodium, métabisulfite de potassium, édétate de sodium, solution d'hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

FORME PHARMACEUTIQUE
Solution injectable

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Anesthésie locale pour usage stomatologique et dentaire.
Anesthésie d'infiltration et anesthésie de conduction.
Xylonor Noradrénaline est particulièrement recommandé dans les interventions longues et difficiles.
Xylonor Noradrénaline est indiqué chez l'adulte, l'enfant et l'adolescent.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Xylonor est indiqué chez l'adulte et l'enfant.
Posologie
Pour un maximum d'efficacité et pour le confort du malade, il est vivement recommandé de faire tiédir la solution anesthésique et de procéder à une injection lente (ne pas dépasser 0,5 ml/15 secondes soit une cartouche par minute). Pour les adultes: La dose moyenne à injecter sera d'une demi-cartouche pour les interventions courantes; pour les interventions longues et difficiles, cette dose pourra atteindre une cartouche et demie, voire deux cartouches. Population pédiatrique : Une attention particulière doit être portée lorsque le traitement est réalisé chez l'enfant de moins de 4 ans.
La quantité à injecter dépend de l'âge et du poids de l'enfant ainsi que du type d'intervention à réaliser. La technique d'anesthésie doit être sélectionnée avec soin. Les techniques douloureuses d'anesthésie doivent être évitées. Le comportement de l'enfant pendant le traitement doit être surveillé attentivement. La dose moyenne à utiliser est de 20 mg à 30 mg de chlorhydrate de lidocaïne par séance. La dose en mg de chlorhydrate de lidocaïne pouvant être administrée chez l'enfantpeut également être calculée comme suit: poids de l'enfant (en kg) x 1,33.
Ne pas dépasser la dose de 5 mg de chlorhydrate de lidocaïne par kilogramme de poids corporel.
Mode d'administration
Voie dentaire.
De façon à éviter tout risque d'injection intravasculaire, aspirer systématiquement avant toute injection, pour s'assurer que la pointe de l'aiguille n'est pas dans la lumière d'un vaisseau.

CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1, et dans les situations suivantes : - troubles de la conduction auriculo-ventriculaire sévères et non appareillés ; - épilepsie non contrôlée par un traitement ; - porphyrie aigüe intermittente; - thyréotoxicose ; - diabète sévère; - maladies ischémiques majeures ou autres maladies cardiovasculaires majeures connues; - hypertension sévère ou arythmie sévère. Ce médicament est généralement déconseillé en association avec certains médicaments comme la guanéthidine et médicaments apparentés (cf. rubrique 4.5 « Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions»).

EFFETS INDESIRABLES
Comme avec tous les anesthésiques utilisés en odonto-stomatologie, des lipothymies peuvent survenir.
Ce médicament contient du bisulfite de potassium qui peut entraîner ou aggraver des réactions de type anaphylactique.
En cas de surdosage ou chez certains patients prédisposés, les signes cliniques suivants peuvent être observés :
- *affections du système nerveux*: nervosité, agitation, bâillements, tremblements, appréhension, nystagmus, logorrhée, céphalées, nausées, bourdonnements d'oreille, vomissements, vertiges. Ces signes d'appel nécessitent de demander au patient d'hyperventiler, ainsi qu'une surveillance attentive pour prévenir une éventuelle aggravation avec convulsions puis dépression du SNC.
- *affections respiratoires, thoraciques et médiastinales*: tachypnée puis bradypnée, pouvant conduire à une apnée.
- *affections cardiaques et vasculaires*: tachycardie, bradycardie, dépression cardio-vasculaire avec hypotension artérielle pouvant aboutir à un collapsus, troubles du rythme (extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire), trouble de la conduction (bloc auriculo-ventriculaire), hypertension.
Ces manifestations cardiaques peuvent conduire à un arrêt cardiaque.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT S.A. - 87 Avenue de la Constitution - 1083 Bruxelles

NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
BE036127

DATE D'APPROBATION DU TEXTE
07/2013

L'Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, la distribution de médicaments s'effectue exclusivement via les pharmacies d'officines (AFMPS).

XYLONOR SPRAY

€38,50

Spray pour anesthésie de surface.

APPLICATIONS

- **Insensibilisation et désinfection des muqueuses avant injection d'une solution anesthésique locale**
- **Anesthésie superficielle pour l'avulsion des dents de lait**
- **Anesthésie locale avant ajustage des bagues de prothèse et bagues d'orthodontie, de couronnes et pose de bridge**
- **Ablation du tartre juxta-gingival**

Solution (lidocaïne) pour usage local présentée en flacon pulvérisateur de 36 g

Réf. 3308J

DENOMINATION
XYLONOR SPRAY

COMPOSITION

Lidocaïne base (DCI)	15,00 g
Cétrimide (DCI)	0,15 g
Excipients q.s.p.	100,00 g

Excipients : saccharine, arôme naturel de menthe, dipropylène glycol, ethanol 96 %

FORME
Solution pour usage local

INDICATIONS
- Insensibilisation et désinfection des muqueuses avant injection d'une solution anesthésique locale.
- Anesthésie superficielle pour l'avulsion des dents de lait.
- Extraction des dents présentant une parodontite évoluée.
- Anesthésie avant ajustage des bagues de prothèse et bagues d'orthodontie, de couronnes et pose de bridge.
- Suppression des réflexes lors des prises d'empreintes.
- Incision et débridement d'abcès superficiel.
- Ablation du tartre juxta-gingival.

Xylonor Spray est indiqué chez les adultes, et chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI
Chaque pulvérisation délivre une dose contenant environ 10 mg de lidocaïne base et couvre une surface de 1 cm de diamètre environ. On pourra répéter cette opération en 4 ou 5 emplacements différents de la muqueuse buccale, au cours de la même séance. Chez l'adulte, ne pas dépasser la dose maximale de 1,6 g de solution, soit environ 20 pressions, pour une anesthésie. La posologie maximale chez l'enfant de plus de 6 ans est de 3 mg/kg. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Ôter le capuchon placé au sommet du flacon et adapter le diffuseur sur le tube métallique, en appuyant à fond; laisser remonter le diffuseur, puis appuyer deux ou trois fois verticalement pour purger la canule. Placer l'extrémité de la canule à environ 2 cm de la partie à anesthésier, puis appuyer sur le diffuseur dans l'axe du flacon.
Remarque : Après application de l'anesthésique sur la muqueuse, il est important de veiller à ce que le patient élimine dans le crachoir l'excès de produit afin de ne pas avaler.

CONTRE-INDICATIONS
- Réactions allergiques aux anesthésiques locaux à liaison amide.
- Hypersensibilité connue au cétrimide (ou à sa classe chimique) ou à l'un des autres constituants de la préparation.
- Infection ou traumatisme dans la zone d'application
- Porphyrie
- Enfant de moins de 6 ans

EFFETS INDESIRABLES
Risque de réaction allergique (rash, urticaire, angioedème) chez les sujets sensibilisés aux anesthésiques de type amide, au cétrimide ou à un autre constituant de la préparation. L'absorption orale de cétrimide peut entraîner des nausées et des vomissements.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT SA, 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Bruxelles

NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
BE036005

DELIVRANCE
Produit réservé à l'usage professionel en odontologie.

DATE D'APPROBATION
07/2013

XYLONOR PELLETS

€64,50

Pellets pour anesthésie de surface.

1 pellet de coton contient, 11,25 mg de lidocaïne

1 emballage contient 200 pellets

Réf. 3180L

DENOMINATION
XYLONOR Pellets

COMPOSITION

	Formule Centésimale	Quantités pour 45 ml
Lidocaïne base	5,00 g	2,25 g
Cétrimide	0,15 g	0,0675 g
Excipients q.s.p.	100,00 ml	

Excipients : saccharine, arôme naturel de menthe, glycérol, eau purifiée, propylène glycol.
XYLONOR Pellets : la solution correspond à la formule ci-dessus et contient 200 pellets de coton.

FORME
Forme liquide utilisée comme anesthésique de surface

INDICATIONS
-Insensibilisation et désinfection des muqueuses avant injections.- Anesthésie superficielle pour l'avulsion des dents de lait.- Extraction des dents pyorrhéiques.- Ajustage des bagues de couronnes et pose de bridges.- Suppression des réflexes dans les prises d'empreintes.- Débridement d'abcès sous-muqueux.- Ablation du tartre dentaire.
XYLONOR est indiqué chez les adultes, et chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI
Prélever un pellet et l'appliquer sur les muqueuses séchées.
Quantité moyenne mise en jeu lors d'une application : 127,8 mg de solution.

CONTRE-INDICATIONS
- Allergie aux anesthésiques de type amide.
- Allergie à l'un des autres constituants de la préparation.

EFFETS INDESIRABLES
Risque de réaction allergique chez les sujets sensibilisés à l'un des constituants de la préparation.
XYLONOR est un produit destiné à être appliqué localement sur les muqueuses buccales.
Les quantités généralement mises en jeu sont d'environ 5 cg par boulette, ce qui correspond à une concentration en lidocaïne d'environ 0,25 mg. Nous nous trouvons donc bien en dessous de la posologie maximale admise : 3 mg/kg.

Les risques allergiques dus aux anesthésiques locaux du type amino-amide sont exceptionnels.
Après administration par voie orale, le cétrimide, comme les autres ammoniums quaternaires, entraîne des nausées et des vomissements. Il possède une action relaxante sur les muscles, due à un phénomène de dépolarisation. Ceci peut entraîner dyspnée et cyanose par paralysie des muscles respiratoires, pouvant aller jusqu'à l'asphyxie. La dose mortelle (DL50) chez la souris par voie orale est comprise entre 1 et 3 g (1).
Le cétrimide peut parfois entraîner des réactions allergiques. Il s'agit cependant d'un phénomène très rare.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT SA, 87 Avenue de la Constitution, B-1083 Bruxelles

NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
BE163326

DELIVRANCE
Produit exclusivement réservé à l'usage professionnel en odontologie.

DATE D'APPROBATION
07/2013

L'Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, la distribution de médicaments s'effectue exclusivement via les pharmacies d'officines (AFMPS).

XOGEL

€64,50

Anesthésie locale des muqueuses buccales à base de 5% de lidocaïne.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES

- **La forme "gel" permet au principe actif de rester au contact de la muqueuse suffisamment longtemps pour une activité optimale.**
- **Action rapide : anesthésie obtenue en 2 à 5 minutes.**
- **Améliore significativement le confort des patients.**

Flacon pompe de 50 g

CHANGEMENT DE CONDITIONNEMENT

XOGEL
ENFANT
Arôme CERISE
Réf 8665I

XOGEL
ADULTE
Arôme MENTHE
Réf 8666J

DENOMINATION DU MEDICAMENT
XOGEL ADULTE 50mg + 1,5mg/g, gel gingival
XOGEL ENFANT 50mg +1,5mg/g, gel gingival

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
1g de XOGEL ADULTE ou de XOGEL ENFANT contient 50mg de lidocaïne et 1,5mg de cétrimide.
Excipients : XOGEL ADULTE : Saccharine, Macrogol 4000, Macrogol 300, Arôme naturel menthe.
XOGEL ENFANT : Saccharine, Macrogol 4000, Macrogol 300, Arôme artificiel cerise.

FORME PHARMACEUTIQUE
Gel gingival.
XOGEL ADULTE : gel incolore, translucide, à odeur de menthe.
XOGEL ENFANT : gel incolore, translucide, à odeur de cerise.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
XOGEL ADULTE et ENFANT sont indiqués pour l'anesthésie locale des muqueuses buccales.
XOGEL ADULTE et ENFANT sont indiqués chez les adultes, et chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'usage professionnel en art dentaire. L'application du XOGEL ADULTE ou ENFANT, gel gingival doit s'effectuer sur une muqueuse préalablement séchée. Le gel est appliqué selon l'indication visée au moyen d'une boulette de coton à raison de 0,10 à 0,20 g de produit fini par application, soit 5 à 10 mg de lidocaïne par application. La dose maximale journalière administrable ne doit pas dépasser 3mg/kg de lidocaïne. Chez un adulte de 70 kg, cette dose maximale représente 200 mg de lidocaïne base, soit 4 g de gel à 5 %. La dose maximale devra être recalculée à partir de cette base dans certains cas particuliers de personnes présentant un mauvais état général. XOGEL ADULTE ou ENFANT ne doit pas être utilisé chez l'enfant en dessous de 6 ans compte tenu de la présence de lidocaïne.

CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à la lidocaïne ou au cétrimide ou aux excipients. - Infection ou traumatisme important dans la zone d'application. - Porphyrie. - Ne pas utiliser chez l'enfant en dessous de 6 ans (présence de lidocaïne).

EFFETS INDESIRABLES
Risque de réactions allergiques chez les sujets sensibilisés aux anesthésiques de type amide, au cétrimide ou à sa classe chimique, ou à l'un des autres constituants de la préparation. L'absorption orale de cétrimide peut entraîner des nausées et des vomissements. Il possède une action relaxante sur les muscles qui est due à un phénomène de dépolarisation. Ceci peut entraîner dyspnée et cyanose par paralysie des muscles respiratoires pouvant aller jusqu'à l'asphyxie.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT NV-SA, Avenue de la Constitution 87, 1083 Bruxelles

NUMEROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
XOGEL ADULTE : BE188535
XOGEL ENFANT : BE188526

DELIVRANCE
Médicaments soumis à prescription médicale

DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE
08/2012

Anesthésie de contact :
Pourquoi opter pour un spray, des pellets ou un gel ?

Dans notre précédent Septodont INFO, nous avons donné la parole à un certain nombre de dentistes sur la question de savoir si l'anesthésie de contact avait une action effective ou plutôt psychologique.
Tous les dentistes étaient d'accord pour dire que le patient ressentait assurément moins de douleur aussi bien de par les principes actifs que par l'aspect psychologique.
Cette fois, nous avons examiné pourquoi les dentistes optaient pour un certain type de pré-anesthésie (sprays, pellets, gels). Est-ce lié à l'indication, s'agit-il d'une préférence personnelle ou est-ce influencé par le choix du patient ?
Nous laissons la parole aux dentistes :

- **Dentiste G.G. – Bruxelles :** "La pré-anesthésie fait partie de manière standard de ma procédure d'anesthésie. Je suis absolument convaincu de l'effet psychologique, que ce soit pour une injection chez des enfants ou des adultes. La procédure d'anesthésie dure tout au plus une minute de plus, mais les patients sont beaucoup plus détendus et l'anesthésie est également moins douloureuse. J'utilise toujours le XOGEL, qui procure une sensation de fraîcheur au patient et qui est facile à utiliser."

- **Dentiste M.S. – Geel :** "J'ai essayé différentes formes de pré-anesthésie, depuis les sprays jusqu'aux gels, mais en définitive ma préférence a été vers les Pellets Xylonor. Ils sont plus concentrés, faciles à doser et je les trouve plus efficaces. J'utilise systématiquement les pellets comme pré-anesthésie, mais également pour des détartrages difficiles para- ou sous-gingivaux. J'ai déjà eu la remarque du goût assez prononcé, mais l'anesthésie est nettement moins douloureuse pour le patient."

- **Dentiste R. S. – Aalst :** "Le confort du patient est pour moi d'une importance déterminante. C'est pourquoi je recours systématiquement à la pré-anesthésie pour chaque injection anesthésique. J'utilise les Pellets de Xylonor parce que je les considère les plus faciles à l'emploi. Vous pouvez appliquer la pré-anesthésie facilement et cela demeure très localisé, contrairement aux sprays et au gel."

- **C.d.I.W. – Woluwe :** "La pré-anesthésie fait partie de manière standard de notre procédure d'anesthésie, et cela pour le confort du patient. Dans notre cabinet travaillent 4 dentistes généralistes, qui appliquent chacun un autre type de pré-anesthésie. Nous utilisons les pellets Xylonor et le Xylonor spray, selon la préférence du praticien traitant. Certains optent pour le spray, d'autres considèrent les pellets avec le liquide anesthésique déjà appliqué plus pratiques."

Conclusion : Tous les dentistes sont convaincus que la pré-anesthésie contribue au confort du patient. Le choix du type de pré-anesthésie est surtout une question de choix personnel.

Découvrez ici toute la gamme de nos anesthésiques de contact, allant des sprays et pellets jusqu'aux gels aux goûts menthe ou cerise.

L'Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, la distribution de médicaments s'effectue exclusivement via les pharmacies d'officines (AFMPS).

PHARMAETHYL

Spray cryo-anesthésique à base de tétrafluoroéthane.

~~€46,50~~
€39,00

Flacon pulvérisateur de 150 ml avec embout doseur
Réf. 0997C

- Production d'une cryo-anesthésie dans la cavité buccale, avant l'extraction d'une dent de lait, de racines de dents pyorrhéiques ou pour la ponction d'un abcès.
- Test de vitalité.

PULPOFLUORANE

Test de sensibilité pulpaire à base de tétrafluoroéthane.

~~€46,50~~
€39,00

Flacon pulvérisateur de 235 ml
Réf. 0856C

INDICATIONS
- Test de sensibilité pulpaire.
- Refroidissement des plaques de malaxage.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
- Efficacité supérieure à celle des sprays de chlorure d'éthyle grâce à l'action refroidissante plus importante du tétrafluoroéthane.

SEPTOJECT®

Septoject®, votre aiguille standard pour toute procédure d'anesthésie.

PRIX PAR BOITE
€11,90
A PARTIR DE 10 BOITES
€7,10

Taille	Diamètre	Code Couleur
X court - 12 mm	30 G	
court - 21 mm	30 G	
court - 25 mm	30 G	
court - 21 mm	27 G	
long - 35 mm	27 G	

Réf. 1603J/1601H/0430T/0432V/1600G

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
- Excellente pénétration tissulaire grâce à une aiguille de haute qualité à triple biseau, avec une canule polie et siliconée.
- Tube d'acier inoxydable chirurgical de grade élevé pour réduire le risque de cassure.
- Indicateur de biseau pour assurer la bonne orientation du biseau.
- Embase plastique à pas de vis métrique.

SEPTOJECT® XL

Septoject® XL, un diamètre interne plus large pour un meilleur confort et une meilleure maîtrise.

PRIX PAR BOITE
€13,90
A PARTIR DE 10 BOITES
€8,50

Taille	Diamètre	Code Couleur
X court - 12 mm	30 G	
court - 21 mm	30 G	
court - 25 mm	30 G	
court - 21 mm	27 G	
long - 35 mm	27 G	

Réf. 2028L/2219J/2027K/1983Z/2220K

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
- Confort : le diamètre interne plus large nécessite moins d'effort pour injecter, même dans les tissus denses.
- Flexibilité accrue grâce aux parois plus fines.
- Amélioration de l'aspiration.
- Même pénétration tissulaire qu'avec une aiguille classique (triple biseau et canule siliconée).

SEPTOJECT® EVOLUTION

Plus de contrôle, plus de confort.

PRIX PAR BOITE
€14,95
A PARTIR DE 3 BOITES
€10,25

Septoject® Evolution a été développée pour une pénétration plus douce, entraînant moins de déplacement de tissus. Ceci signifie plus de confort pour vos patients, même lors d'injections multiples.

NOUVELLES DIMENSIONS DISPONIBLES

Références:

nouveau 5984G 27G / 0,40 x 9 mm (marron)
nouveau 5985H 27G / 0,40 x 16 mm (orange)
5751H 27G / 0,40 x 25 mm (orange)
5748E 30G / 0,30 x 9 mm (mauve)
nouveau 5749F 30G / 0,30 x 16 mm (bleu)
5750G 30G / 0,30 x 25 mm (bleu)



Protégez-vous et protégez votre personnel contre les piqûres accidentelles

ACTUALITE
Nouvelle directive par rapport au recapuchonnage

Septodont offre des solutions sur mesure pour vous protéger de la manière la meilleure et la plus avantageuse possible contre les piqûres accidentelles :

A **Si vous exercez seul,** Safepoint constitue alors la solution idéale pour vous. Safepoint est un dispositif d'élimination mécanique des aiguilles, vous pouvez ainsi dévisser votre aiguille après le traitement en toute sécurité.

SAFE POINT

L'unité comprend :
a) Le dispositif mécanique d'élimination d'aiguilles
b) Le conteneur à aiguilles a une capacité de contenance de 250 aiguilles

3 conteneurs par emballage sont livrés

Les conteneurs sont collectés et traités avec les déchets médicaux.

Réf. SHA36133014

~~€399,00~~
€299,00

€349,00
INTROPACK :
SAFE POINT
+ 10 BOITES
SEPTOJECT®XL

B Pour des **traitements chirurgicaux** ou si vous préférez **travailler avec des instruments à usage unique**, nous avons développé un système stérile et entièrement disposable. Une aiguille stérile et une poignée stérile pour utilisation unique.

ULTRA SAFETY PLUS XL - POIGNEES STERILES A USAGE UNIQUE

1 boîte contient
50 aiguilles stériles.

27G/35 - 30G/12
30G/21 - 30G/25

€16,00
A PARTIR
DE 6 BOITES
€12,50

Réf. 5779J/5776G/5777H/5778I

1 boîte contient
50 poignées stériles.

€37,50
A PARTIR
DE 6 BOITES
€29,95

Réf. 5449S

C Pour tous vos **traitements quotidiens**, optez pour Ultra Safety Plus XL avec poignée autoclavable ou seringue en inox.

SERINGUE EN INOX POUR ULTRA SAFETY PLUS

Une seringue en acier inoxydable pour Ultra Safety Plus est disponible comme alternative pour les poignées autoclavables (noires) et les poignées stériles (blanches).

La séringue en INOX est auto-aspirante et est adaptée à la thermo-désinfection. Elle est également autoclavable.
Réf. 2211 K

~~€87,50~~
€69,00

OFFRE D'INTRODUCTION

3 boîtes Ultra Safety Plus XL
+ 5 poignées autoclavables
=
€89,00

1 boîte contient 100 aiguilles stériles et 1 poignée noire autoclavable.

Ultra Safety Plus XL est disponible dans les tailles suivantes :
27G/35 - 30G/12 - 30G/21 - 30G/25
Réf. 5286L/5280F/5282H/5283I

Prenez contact avec un de nos délégués, ils vous conseilleront le mieux possible afin de pouvoir faire le choix optimal pour votre cabinet.

Découvrez toutes les solutions disponibles et faites votre propre choix

GEL

Racegel peut également être utilisé en combinaison de Septofil pour les restaurations subgingivales.

2 x RACEGEL + SEPTOFIL GRATUIT
(1 référence au choix)
€119,00

Racegel est le seul gel créant un environnement sec et propre pour la gestion de toutes vos préparations gingivales :

1. Prise d'empreintes
2. Cavités de classe II et de classe V
3. Mise en place de couronnes ou de facettes

Avantages de RACEGEL :

- Une forte action hémostatique (contient 25% de chlorure d'aluminium)
- Gel : Simple à appliquer et également simple à éliminer par rinçage (pas de saignement après rinçage)
- Eviter une rétraction visuelle du sulcus, et quand même obtenir une impression optimale (moins traumatique pour le patient)
- Possibilité de combiner avec le fil de rétraction Septofil

RACEGEL

~~€79,00~~
€59,00

Coffret comprenant : 3 seringues de 1,4 g gel
30 embouts applicateurs
Réf. 5901B

FIL - SOLUTION - FIL IMPREGNE

SEPTOFIL

Fil de rétraction non imprégné

Septofil fil de rétraction peut être combiné avec Racestyptine liquide.

SEPTOFIL + SOLUTION RACESTYPTINE
(13 ml) ~~€104,50~~ **€65,00**
(45 ml) ~~€163,00~~ **€79,00**

SOLUTION RACESTYPTINE

Solution pour rétraction gingivale

13 ML €55,00
45 ML €113,50

INDICATION
- Préparation de la prise d'empreinte : rétraction gingivale en imprégnant le fil de rétraction in situ.
- Hémostase lors d'un saignement gingival (même sans l'usage de fils de rétraction)

Avantages de RACESTYPTINE :

- Contient 25% de chlorure d'aluminium pour un effet astringent doux et d'excellentes propriétés hémostatiques.
- Précipite les protéines tissulaires et sériques, induisant une hémostase locale et une contraction des couches supérieures de la gencive libre.

Références :
0165J Flacon de 13 ml, pipette
0299N Flacon de 45 ml, pipette

Une bonne empreinte est le résultat d'une bonne préparation : un environnement sec et propre et si souhaité une rétraction visuelle transitoire du sulcus. Afin de réaliser votre préparation gingivale, il existe différentes solutions (gel, pâte, fils de rétractions imprégnés ou non imprégnés, solution). Septodont est la seule société à vous offrir une gamme complète : vous pouvez faire le choix optimal en fonction de votre traitement et de votre préférence personnelle.

€49,50

2 PIÈCES POUR
€50,00

INDICATIONS
Rétraction de la gencive libre au cours de la préparation de la dent, insertion d'essai pour restauration, prise d'empreinte et scellement ou collage définitif.

Caractéristiques et bénéfices de SEPTOFIL :

- Fil en coton disponible en quatre épaisseurs différentes pour répondre à chaque situation clinique.
- Fil tricoté afin d'améliorer l'effet mécanique sur la gencive libre.
- Capacité d'absorption d'une solution astringente améliorée.
- Pour optimaliser l'usage, Septofil peut être imprégné avec Racestyptine liquide ou en combinaison avec Racegel.

Références :

2073E	Fil ultrafin (Ø 0,5 mm, 2,5 m)
2074F	Fil fin (Ø 0,6 mm, 2,5 m)
2075G	Fil moyen (Ø 0,8 mm, 2,5 m)
2076H	Fil épais (Ø 1,0 mm, 2,5 m)

FIL RACESTYPTINE

Fil imprégné pour rétraction gingivale

€54,00

2 PIÈCES POUR
€55,00

INDICATIONS
- Rétraction de la gencive libre avant prise d'empreinte.
- Contrôle des saignements et exsudats gingivaux avant la préparation de la dent, insertion préliminaire pour restauration et scellement ou collage définitif.

Avantages de RACESTYPTINE FIL DE RÉTRACTION :

- Contient de la lidocaïne pour minimiser l'inconfort du patient au cours de la mise en place.
- Fil en coton/polyester disponible en 2 épaisseurs différentes pour répondre à chaque situation clinique.
- Imprégné de chlorure d'aluminium hexahydraté pour un effet astringent doux et d'excellentes propriétés hémostatiques.

Références :

0530K	Fil fin (Ø 0,6 mm, 4 m)
0166K	Fil moyen (Ø 0,8 mm, 4 m)

PATE NOUVEAU !

RACECORD CAPS

Pâte de rétraction gingivale temporaire

€150,00

€109,00

INDICATIONS
- Prise d'empreinte
- Dentisterie restauratrice : isolation des cavités juxta-gingivales

Avantages de RACECORD CAPS :

- Facile et sans fil
- Elargissement visible du sillon gingival
- Confort et facilité d'une pâte
- Dégagement de votre champ opératoire en contrôlant vos fluides - effet hémostatique (15% de chlorure aluminium)

Mode d'emploi :

1. Préparer la dent.
2. Appliquer la pâte lentement autour de la préparation dans le sillon gingival.
3. Laisser agir la pâte pendant environ 2 minutes pour permettre la rétraction de la gencive.
4. Éliminer totalement la pâte du sillon gingival et de la cavité buccale à l'aide d'eau/air/spray via la seringue multifonctions.
5. Réaliser l'empreinte.

PRÉSENTATION
- 20 capsules de 0,5 g
- 20 embouts applicateurs Luer-Lock

Réf. 8926J

PERFEXIL PLATINIUM + PUTTY

Matériel d'empreinte très stable et précis.

€98,00
A PARTIR DE 3 BOITES
€59,00

1 pot de 400 g (280 ml) base (blanc)
+ 1 pot de 400 g (280 ml) catalyseur (couleur)

Réf. 4877S PUTTY SOFT (vert)
Réf. 4879U PUTTY SOFT RAPIDE (bleu)
Réf. 4875Q PUTTY HARD (gris)
Réf. 4881W PUTTY SUPER SOFT RAPIDE (bleu-turquoise)

PERFEXIL PLATINIUM + CARTOUCHES

€66,00
A PARTIR DE 3 BOITES
€39,00

2 X 50 ml,
12 embouts applicateurs

Réf. 4885A CARTOUCHES SUPERLIGHT (jaune)
Réf. 4873O CARTOUCHES LIGHT (saumon)
Réf. 4871M CARTOUCHES LIGHT RAPIDE (orange)
Réf. 4883Y CARTOUCHES REGULAR (violet)

PLASTALGIN & PLASTALGIN FAST

Alginates

€11,10
A PARTIR DE 10 BOITES
€7,90

PLASTALGIN
Normal - vert
Arôme : pomme
Sachet de 454 g

Réf. 5942Q

PLASTALGIN FAST
Rapide - bleu
Arôme : abricot
Sachet de 454 g

Réf. 2045C

SECURALLOY

Amalgame à faible teneur en mercure facile à manipuler

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Formulation non gamma 2, sans zinc pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Composition unique et haute teneur en cuivre, particules sphériques pour une manipulation facile et un polissage rapide.
- Excellente adaptation marginale pour les restaurations à long terme.

n°1 ~~€67,00~~ €45,00
n°2 ~~€77,00~~ €55,00
n°3 ~~€87,00~~ €69,00
n°4 ~~€98,00~~ €79,00

Réf. 2419B SECURALLOY capsules n° 1
Réf. 2421D SECURALLOY capsules n° 2
Réf. 2423F SECURALLOY capsules n° 3
Réf. 2628C SECURALLOY capsules n° 4

N'DURANCE® DIMER FLOW

~~€57,50~~ €36,00

- Viscosité exceptionnelle pour une mise en place facile.
- Rétraction volumétrique faible.
- Taux de conversion de monomères élevé (75%).
- Extrêmement hydrophobe pour une meilleure stabilité de la couleur.

2 seringues de 2 g + 20 embouts ultrafins
7 teintes : A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, Universal Opaque

N'DURANCE® DIMER CORE

~~€67,00~~

€57,50

2 BOÎTES DE N'DURANCE® DIMER CORE + KIT MIRAFIT® BC GRATUIT **€115,00**

N'Durance Dimer Core est un composite "Nano-Dimer" Dual Cure pour la reconstitution des faux moignons. N'Durance® Dimer Core permet une reconstruction plus rapide et plus facile du moignon et garantit la pérennité de la restauration.

2 x 9 g, 20 mixing tips, 20 embouts intra-oraux
Réf. 8580B N'Durance® Dimer Core - Natural
Réf. 8581C N'Durance® Dimer Core - Bleach White

KIT MIRAFIT® BC GRATUIT

à l'achat de 2 boîtes de N'Durance Dimer Core

GRATUIT

Mirafit® BC
Capsules en plastique pour réaliser votre reconstitution de faux-moignon de manière plus précise, plus rapide et plus simple. Capsules en 6 tailles différentes.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Une consistance similaire à celle de la dentine pour une taille précise et maîtrisée.
- Une excellente viscosité fluide pour une adaptation idéale aux zones rétentives.
- Disponible en deux teintes répondant à toutes les situations cliniques : "Natural" pour une harmonisation parfaite avec les tissus dentaires avoisinants et "Bleach White" pour un meilleur contraste qui facilite la préparation marginale.
- Un meilleur taux de conversion intra-orale des monomères procurant une bio-tolérance optimale.
- Un module de flexion réduit optimalisant l'absorption et la répartition des tensions pour une restauration durable.
- Une excellente radio-opacité pour un contrôle plus aisé à court et à long terme.

N'DURANCE® SERINGUES & TIPS

€57,50

A PARTIR DE 3 BOITES **€36,00**

- Composite avec la technologie Nano-dimer pour les restaurations antérieures et postérieures : meilleure biocompatibilité et durabilité.
- Radio-opacité supérieure.

Composite - seringue : 1 seringue de 4,5 g
Composite - tips : 20 tips de 0,25 g
Teintes disponibles : A1,A2,A3,A3.5,A4,B1 B2,B3,C2,C3,TR, BW ou UO

N'DURANCE® CRISTAL

N'Durance® Cristal

€63,90

A PARTIR DE 3 BOITES **€41,00**

Seringues et tips

Refill avec 1 seringue de 4,5 g
(A1, A2, A3, A 3.5, B1, B2, C2, Incisal)
Tips 20 x 0,25 g
(A1, A2, A3, A 3.5, B1, B2, C2, Incisal)

Kit d'introduction esthétique N'DURANCE® Cristal

~~€225,00~~

€149,00

COMPRENANT : UN INSTRUMENT POUR LES COMPOSITES

4 seringues (A2,A3, A3.5, Incisal). Kit d'introduction également disponible en tips au lieu de seringues.

NOUVEAU ! Case Studies Collection 7

Deux produits occupent une place centrale dans la 7ème édition de la Case Studies Collection :

Biodentine™, la première et la seule dentine en capsule
R.T.R.® un substitut osseux de phosphate tricalcique
Plus d'info sur R.T.R.® en page 21

Cas 1
L'utilisation de biomatériaux pour la régénération osseuse en chirurgie orale. Evaluation de R.T.R.® en tant que matériau de régénération osseuse par le Prof. Mauro Labanca, Milan, Italie. R.T.R.®, utilisé pour diverses indications cliniques : post-extractions, sinus-lifts, etc…, est simple à utiliser et procure de bons résultats cliniques sur le court terme. Le suivi sur le long terme sera abordé dans l'édition suivante de la Case Studies Collection.

Cas 2
Régénération osseuse post-extraction, Prof. Oscar H. Arribasplata Loconi, Université Norbert Wiener, Lima, Pérou. R.T.R.® procure de bons résultats dans les indications post-extraction, analyse clinique histologique et tomographique du matériau sur le long terme (12 & 18 mois après le placement).

Cas 3
Restauration d'une cavité profonde avec Biodentine. S. Banerji du King's College de Londres, R.U. Découvrez comment Biodentine™ peut maintenir la vitalité pulpaire dans les cas de cavités profondes et aider ainsi à éviter un traitement endodontique.

Cas 4
Traitement de la perforation du plancher pulpaire à l'aide de Biodentine™, Prof. Irene, Université de Montevideo, Uruguay.

Les propriétés de scellement, la facilité d'utilisation, la prise rapide font de Biodentine™ le matériau par excellence pour traiter les perforations de la chambre pulpaire et éviter ainsi une possible extraction.

Scannez le code-QR
ou consultez
www.septodont.be

BIODENTINE™ COFFRET

€165,00

€295,00

par 2 coffrets
+ 5 applications supplémentaires gratuites

Réf. 5470N

PARCAN

€40,50

Solution stabilisée d'hypochlorite de sodium à 3%.

3 flacons de 120 ml (plastique)
Réf. 1910X

PARCAN

€32,00

Solution stabilisée d'hypochlorite de sodium à 3%.

Flacon de 250 ml (verre)
Réf. 0086I

CHOISISSEZ 3 PRODUITS SUR CETTE PAGE

25% de réduction

à l'achat de 3 produits sur la page 15

+

Endopipettes GRATUIT

ENDOCAL

€73,00

Gel d'hydroxide de calcium à 52% pour assainissement endodontique et pour une obturation temporaire des canaux.

Seringue 4 g + 30 embouts
Réf. 2270I

LARGAL ULTRA

€66,00

Chélatant pour l'alésage chimique des canaux à base d'EDTA et de CETRIMIDE.

Flacon de 125 ml
Réf. 4698V

ENDOSOLV E

€46,50

Désobturation des canaux pour EUGENATES.

Flacon de 13 ml
Réf. 1445H

ENDOSOLV R

€46,50

Solution de formamide

Facilite l'élimination des agents de scellement canalaire à base de résinephénoplaste.

Flacon de 13 ml
Réf. 0108E

R4

€71,00

Solution pour assainissement endodontique à base de CHLORHEXIDINE.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Basse tension de surface afin d'assurer la pénétration de la solution dans les tubules dentinaires.
- Large spectre et action rapide sur les agents pathogènes du système canalaire (testé sur treize souches bactériennes anaérobies).
- Formule non irritante, bien tolérée par les tissus péri-apicaux.
- Effet durable.

Flacon de 13 ml
Réf. 5721D

GUTTASOLV

€46,50

Désobturation des canaux pour GUTTA -PERCHA.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Solution d'eucalyptol à 100%
- Facilite l'élimination des obturations endodontiques à base de gutta-percha.
- Ramollit les matériaux d'obturation à base de gutta-percha, ce qui permet un gain de temps et une désobturation efficiente.
- Ramollit les cônes en gutta-percha afin de permettre une parfaite adaptation entre le cône maître et les parois canalaires.
- Permet de fabriquer des cônes de gutta-percha adaptés à des situations cliniques spécifiques.

Flacon de 13 ml
Réf. 2141U

ENDOMETHASONE N POUDRE

Sans formaldehydes

~~€144,00~~

Flacon de 42 g de poudre
Réf. 3425W

€120,00

~~€81,50~~

Flacon de 14 g de poudre
Réf. 2613N

€70,00

ENDOMETHASONE LIQUIDE

~~€26,90~~

€23,00

Flacon de 10 ml de liquide
Réf. 2622W

ENDO-PERIO NEEDLES

Canules d'irrigation endocanalaire à bout mousse et ouverture latérale.

~~€65,00~~

€55,00

Boîte de 100 canules
Références :
ES501 ENDO-PERIO-NEEDLES 23G / 0,60 x 33 mm (bleu)
ES511 ENDO-PERIO-NEEDLES 27G / 0,40 x 33 mm (jaune)
ES521 ENDO-PERIO-NEEDLES 30G / 0,30 x 33 mm (mauve)

OXYDE DE ZINC

~~€41,50~~

€32,00

INDICATIONS
- Obturation canalaire définitive.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
- Deux temps de prise s'adaptant à chaque besoin clinique.
- Se mélange à l'eugénol pour une pâte non résorbable et non rétractable.

Références :
1907U Pot de 190 g (lourd)
1943E Pot de 190 g (léger)

CANAL+

~~€46,50~~

€38,00

Gel EDTA

INDICATIONS
- Préparation du système canalaire.
- Lubrification des instruments.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
- Gel lubrifiant et hydrosoluble.
- Adhère aux instruments et facilite la préparation mécanique.
- Permet un alésage mécanique plus facile et plus rapide, car l'EDTA chélate les composants minéraux de la dentine.
- Optimise le nettoyage du système canalaire s'il est utilisé en association avec la solution d'irrigation Parcan grâce aux propriétés effervescentes du peroxyde de carbamide.

Seringue de 5 g, 15 embouts applicateurs
Réf. 2319F

POINTES ENDO: GUTTA - PAPIER - ACRYLIQUE

SEPTOPOINTES GUTTA 2%

~~€21,00~~
€15,00
par numéro
~~€50,00~~
€39,00
par assortiment

Par numéro : 15,20,25,30,35,40,50 (100 pointes)
Assortiment : 15,20,25,30,40 en 50 (300 pointes)

SEPTOPOINTES PAPIER 2%

~~€21,00~~
€15,00
par numéro
ou
par assortiment

Par numéro : 15,20,25,30,35,40,50 (300 pointes)
Assortiment : 15,20,25,30,40,50 (300 pointes)

SEPTOPOINTES ACRYLIQUES

~~€45,00~~
€35,00
par numéro

Par numéro : 15,20,25 of 30 (50 pointes)

SEPTOMIXINE

€101,00

Pâte antibiotique et anti-inflammatoire résorbable pour traitement des canaux radiculaires infectés.

Tube de 5 g
Réf. 3347W

DENOMINATION DU MEDICAMENT
SEPTOMIXINE, 286mg/g + 190 000 UI/g, pâte dentaire.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
1 g de pâte contient 286 mg d'Acétate d'hydrocortisone et 190 000 UI de Sulfate de framycétine. Excipients : propylène glycol, glycérol

FORME PHARMACEUTIQUE
Pâte dentaire.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
Septomixine est indiquée pour la réduction des phénomènes douloureux et la désinfection canalaire au cours : - des traitements canalaires après pulpectomie - des traitements de desmodontie d'origine septique ou médicamenteuse.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Produit exclusivement réservé à l'usage professionnel en art dentaire. Avant d'utiliser ce produit, il est conseillé d'effectuer un parage canalaire ou de débarasser les canaux des débris éventuels. Sécher le canal et l'emplir du produit à l'aide d'un bourre-pâte rotatif. Le produit sera laissé en place pendant trois jours au moins, puis le canal sera à nouveau nettoyé, et enfin obturé par une pâte classique.

CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité à l'hydrocortisone ou à la framycétine ou à l'un des excipients.

EFFETS INDÉSIRABLES
Aucun effet indésirable n'a été reporté à ce jour concernant l'utilisation conforme de Septomixine. De part sa formule, Septomixine peut toutefois engendrer les effets indésirables suivants : Système immunitaire : Réaction d'hypersensibilité possible. Framycétine : - Allergies croisées aux aminoglycosides possibles. Hydrocortisone : - Des réactions d'hypersensibilité peuvent très rarement apparaître.
Effets indésirables systémiques lors d'une application locale : Sulfate de framycétine : Lors de la résorption de la framycétine (plaies, muqueuse endommagée) certains effets indésirables, tels que des effets oto- et neurotoxiques ou des blocages neuromusculaires peuvent apparaître

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
SEPTODONT NV-SA, 87, Avenue de la Constitution, B-1083 Bruxelles

NUMERO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
BE158426

MODE DE DELIVRANCE
Médicament soumis à prescription médicale.



L'Arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, la distribution de médicaments s'effectue exclusivement via les pharmacies d'officines (AFMPS).

ISODAN

Agent de désensibilisation

~~€98,00~~
€65,00

INDICATIONS
- Traitement de l'hypersensibilité dentinaire, occasionnée par le contact avec les températures extrêmement chaudes ou froides, par les solutions acides ou qui peut être d'origine psychologique.
- Lorsque le patient se plaint d'hypersensibilité dentinaire, ceci signifie qu'une partie de l'émail est absente et que la dentine est exposée.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Efficacité prouvée, soulagement durable de la douleur.
- Forme une barrière dans les tubules dentinaires et empêche les mouvements de fluides intratubulaires.
- Contient du fluorure de sodium qui renforce la barrière émail/dentine.
- Contient de l'HEMA agissant comme agent mouillant pour une diffusion homogène d'Isodan.
- Peut être utilisé sous les matériaux de restauration.

Flacon de 5 ml, 20 pinceaux applicateurs
Réf. 1859E

ISODAN EST UTILISE POUR :
- La mylolyse, l'érosion cervicale, l'exposition radiculaire
- L'élimination du tartre, le polissage et les traitements paro
- Le blanchiment
- Le traitement des cavités sur dents vitales

LES RESULTATS DE 211 ETUDES CLINIQUES*

SECURITE/CONFORT DU TRAITEMENT
Appréciation du ressenti de traitement par le patient
Confortable : 86%
Inconfortable : 10%
Pas d'opinion : 4%

EFFICACITE/DELAI D'ACTION
Appréciation de l'efficacité du traitement par la réaction des patients
Pleinement réussi : 70%
Partiellement réussi : 21%
Pas d'amélioration : 2%
Faible amélioration : 7%

Evaluation de la douleur (visualisation EVA)



Frédéric Bohin (Department of Preventive Odontology and Endodontia, UFR Odontology, Paris V Montrouge)
Jérôme Lafont (Department of Preventive Odontology and Endodontia, UFR Odontology, Montpellier)

* L'hyperesthésie dentinaire (évaluation clinique de l'efficacité d'un nouvel agent de désensibilisation)

DETARTRINE

Pâte prophylactique

INDICATIONS
- Traitement prophylactique après détartrage.
- Élimination des colorations dues à des boissons, des aliments et au tabac.
- Polissage des surfaces dentaires.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Action abrasive purement mécanique due à la présence de silice.
- Sens de fraîcheur grâce aux essences incorporées dans la formule.

~~€46,50~~
POT 45 G
RÉF. 2624Y
€36,50

~~€71,00~~
POT 150 G
RÉF. 0284Y
€56,50

DETARTRINE Z

ZIRCONS

~~€46,50~~
€36,50

Detartrine Z contient de la poudre de zirconium pour une meilleure efficacité sur les colorations les plus résistantes (boissons, aliments, tabac).

Pot 45 g
Réf. 2620U

DETARTROL ULTRA

~~€57,00~~
€40,00

Solution d'acide chlorhydrique à 20%

INDICATIONS
- Ramollissement du tartre au cours de traitements parodontaux.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- L'acide chlorhydrique permet de ramollir délicatement les blocs de tartre et facilite ainsi leur élimination au cours d'un détartrage manuel ou mécanique.
- Procure plus de confort au patient au cours des traitements parodontaux, particulièrement quand le support osseux de la dent est faible ou quand des dépôts adhèrent fortement.
- La coloration temporaire des dépôts facilite leur localisation et leur élimination, améliorant ainsi l'efficacité du traitement.

Flacon de 13 ml
Réf. 0594W

CALYPSO

~~€70,50~~

€49,00

Bain de bouche aromatisé

INDICATIONS
- Solution pour bain de bouche utilisable en début ou en cours d'intervention.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Prépare le champ opératoire.
- Assure l'élimination des débris et du sang en cours d'intervention.
- Procure au patient une sensation de fraîcheur entre deux étapes de l'intervention.
- Disponible en trois arômes (menthe, orange, framboise) afin d'offrir au patient le rinçage buccal de son choix.
- Présenté sous forme concentrée, Calyspo se dissout immédiatement dans l'eau.

3 flacons de 500 ml (arôme menthe, arôme orange, arôme framboise) + 3 pompes doseuses
Réf. 5467K

GELOPACK

~~€44,00~~

€30,00

30 éponges de gelatine

Stérile, résorbable, origine animale (porc)
Réf. 2259X

GELOPACK BLISTER

~~€55,50~~

€50,00

3 x 10 pièces éponges de gelatine sous blister.

PAR 3 PIECES

€105,00

Stérile, résorbable, origine animale (porc)
Réf. 2518W

HEMOCOLLAGENE

~~€57,50~~

€50,00

24 éponges hémostatiques sous blister

PAR 3 PIECES

€109,00

INDICATION
Hémostase locale après les interventions chirurgicales dentaires.

Stérile, résorbable, origine animale (bovin)
Réf. 01170

SEPTO-PACK

~~€70,50~~
€49,00

Pansement occlusif gingival

INDICATIONS
- Pansement protecteur gingival après traitement parodontal localisé.
- Pansement provisoire (éviction gingivale avant restauration de caries du collet).

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Pâte auto-durcissante pour un maintien facile dans la cavité.
- Peut être utilisée comme support neutre à certains médicaments, les maintenant en place au niveau des tissus dentaires et parodontaux.
- Facile à enlever grâce à sa consistance après durcissement.

Pot de 60 g
Réf. 5722E

SEPTOCALM

~~€70,50~~
€52,00

INDICATION
- Cautérisation des ulcères tissulaires et des aphtes.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Solution aqueuse d'acide trichloracétique à 35% avec effet caustique.
- Soulagement immédiat de la douleur.
- Accélère le processus de cicatrisation naturel par régénération des muqueuses lésées de la cavité buccale.

Réf. 2394C

PERIOFILM

~~€205,00~~
€165,00

Antibiotique local à libération programmée (7 à 10 jours) dans une solution filmogène adhésive.
La Piperacilline Sodique est active sur les Gram+, Gram- et sur Pseudomonas.

INDICATIONS
- Traitement local des poches parodontales
- Traitement local des peri-implantites
- Traitement local des sites d'extraction
- Protection des plaies après chirurgie

Réf. 2615P

ALVEOGYL

Pansement alvéolaire imprégné d'eugenol.

€69,00

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Avec une texture fibreuse, grâce aux fibres de Penghawar, pour une mise en place aisée et une bonne adhérence à l'alvéole.
- Procure un effet calmant sur les tissus alvéolaires, permettant ainsi de rapidement soulager la douleur.
- Pratique et facile à utiliser : Alveogyl s'utilise en une séance et s'élimine naturellement, ne demandant ni suture ni attention particulière hormis la surveillance du processus de cicatrisation.
- Peut être également utilisé en tant que pansement aprés extraction chez les patients ayant un historique d'alvéolite sèche.

Pot de pâte 10 g
Réf. 5712U

Évitez une perte de volume osseux après extraction

R.T.R.®

(Resorbable Tissue Replacement)

R.T.R.® est un matériau de substitution osseuse d'une très grande pureté à base de phosphate tricalcique ß qui aide à la néoformation osseuse en toute sécurité après une extraction ou toute perte osseuse (lésion intra osseuse, sinus-lift...)

- **Résorption progressive et totale**
  R.T.R.® libère des ions calcium et phosphate favorisant la néoformation osseuse.
- **Régénération de la croissance osseuse naturelle**
  Les structures ostéo-conductrices à micro- et macroporosités favorisent la néoformation osseuse.
- **Restauration du volume**
  R.T.R.® renouvelle l'intégrité osseuse en 3 à 6 mois.

R.T.R.® - RESORBABLE TISSUE REPLACEMENT

Substitut osseux en phosphate tricalcique ß.

Comblement de perte osseuse à la suite d'une extraction dentaire, traitement d'une lésion intra-osseuse.
Substitut osseux au cours de procédures d'élévation de sinus.



R.T.R.® - SERINGUE

~~€82,50~~
€69,00

Seringue courbe de 0,8 cm³
(granulométrie entre 500 µm et 1 mm)
Double emballage individuel stérile
Réf. 5619F

R.T.R.® - GRANULES

~~€113,00~~
€89,00

Flacon de 2,0 cm³
Emballage stérile
Réf. 5620G



2 cônes de 0,3cm³ (Ø 6 mm / h 10 mm)
Collagène en double emballage stérile
Réf. 5618E

R.T.R.® - CONES

~~€106,00~~
€85,00

VAPOSEPT PLUS

€101,00

Désinfection des surfaces et des surfaces des dispositifs médicaux.

Bidon de 5 L
Réf. 5733P

VAPOSEPT PLUS SPRAY

€60,00

Désinfection à action rapide des dispositifs médicaux préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.

2 flacons avec pulvérisateur 750 ml
Réf. 5731N

CHOISISSEZ 3 PRODUITS DE LA GAMME DE DÉSINFECTION

à l'achat de 3 produits sur la page 22

25% de réduction

QUITANET PLUS 2 x 1 L

€45,00

Solution désinfectante concentrée pour instruments.

INDICATION
- Nettoyage et désinfection des instruments.
- S'utilise en trempage et en cuve à ultrasons.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Economique : la solution diluée (2%) reste active pendant 24 heures.

2 flacons de 1l
Réf. 5785P

SAPOFILM

€61,00

Base lavante pour le lavage fréquent des mains.

3 x 980 ml + 2 pompes doseuses
Réf. 0420E

DERMAFILM GEL

€100,00
6 FLACONS

Gel antiseptique et hydroalcoolique

Conforme à la norme EC 1500

6 flacons de 500 ml + 6 pompes doseuses
Réf. 5412H
Utilisez Dermafilm avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ROTAGERM

€45,00

Solution de nettoyage et désinfection des fraises

INDICATIONS
- Nettoyage et désinfection des fraises.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Bactéricide en 15 min : EN 1040, EN 13727, EN 14561.
- Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK) en 15 min.
- Levuricide en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
- Actif sur HIV-1, HBV, Herpes virus et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min.

Flacon de 2 litres
Réf. 5853F

NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR PRÉVENIR LES PIQÛRES ACCIDENTELLES?

RESTEZ COUVERT

CONFORME À LA NOUVELLE RÉGLEMEN-TATION[1]!

ULTRA SAFETY PLUS
DISPOSITIFS SÉCURISÉS.

Poignée stérile à usage unique ou autoclavable.
Fourreau transparent grâce auquel l'auto-aspiration est visible.
Possibilité de changement de carpule lorsqu'un complément d'anesthésie est nécessaire.
Fourreau de protection rétractable pour éviter les piqûres accidentelles

En tant que leader mondial de l'anesthésie dentaire[2], Septodont répond à la demande croissante de solutions sûres et simples pour satisfaire aux nouvelles recommandations de sécurité.

Au cours des années précédentes, Ultra Safety Plus a démontré son efficacité et sa facilité d'utilisation et est devenu le standard dans la prévention des piqûres accidentelles pour chaque procédure d'anesthésie dentaire. Un bel exemple est l'utilisation d'Ultra Safety Plus au Royaume Uni où il représente 45% de tous les systèmes d'injection sécurisés utilisés dans les pratiques de groupe et les cliniques dentaires[3].

Ultra Safety Plus est disponible avec un grand assortiment d'aiguilles, de plus vous pouvez choisir entre l'utilisation d'une poignée auto-clavable ou une poignée entièrement stérile à usage unique. Il peut ainsi convenir à chaque type d'injection. Ultra Safety Plus est pourvu de manière standard de l'aiguille Septoject XL.

Ultra Safety Plus. Restez Couvert.

[1] Directive Européenne 2010/32/EU du 10 mai 2010

[2] Septodont est la seule entreprise qui produit annuellement plus de 500 millions de carpules dentaires

[3] Source SDM,YTD Q3 2012

Septodont NV-SA - Avenue de la Constitution 87 - 1083 Bruxelles
Tél. 02 425 60 37 - Fax 02 425 36 82
info@septodont.be

www.septodont.be

septodont

Les super promos

promo

N'DURANCE® DIMER CORE

€115,00

2 BOÎTES DE N'DURANCE® DIMER CORE
+ KIT MIRAFIT® BC GRATUIT

kit Mirafit® BC GRATUIT

À L'ACHAT DE 3 PRODUITS DE LA GAMME ENDODONTIE EN PAGE 15

25% de réduction

+

Endopipettes GRATUIT

À L'ACHAT DE 3 PRODUITS DE LA GAMME DE DÉSINFECTION EN PAGE 22

25% de réduction

HEXIDIS PLUS

~~€155,00~~

€99,00

Lingettes désinfectantes :
12 x 150 pièces.

1800 LINGETTES

INDICATION
- Nettoyage et désinfection des instruments, des dispositifs médicaux non invasifs et des surfaces.

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES
- Spécifiquement conçu pour le nettoyage et la désinfection rapide (30 s) des dispositifs médicaux non invasifs.
- Lingettes résistantes.
- Séchage rapide sans traces ni résidus.
- Laisse un parfum frais et agréable d'agrumes.

Réf. 5979B

Pour nos offres spéciales sur nos anesthésiques, contactez votre représentant

Hainaut
Bruxelles
Brabant Wallon
Claude Verbruggen
0477 99 74 49
cverbruggen@septodont.com

Bruxelles
Brabant Wallon
Namur
Bruno Boon
0470 29 29 66
bboon@septodont.com

Liège
Luxembourg
Grand-duché du Luxembourg
Bernadette Martin
0475 89 66 17
bmartin@septodont.com

Flandre Orientale
Flandre Occidentale
Hilde De Wilde
0475 23 61 69
hdewilde@septodont.com

Brabant Flamand
Flandre Orientale
Bruxelles
Murielle D'Hondt
0476 98 10 39
mdhondt@septodont.com

Limbourg
Anvers
Nathalie Masset
0496 41 92 92
nmasset@septodont.com

Support vente fr
Robert Cruybeke
Tel. 02 425 60 37
Fax 02 425 36 82
commande@septodont.be

Support vente nl
Evelyne De Groote
Tel. 02 425 60 37
Fax 02 425 36 82
order@septodont.be

Contact

SEPTODONT NV-SA
Avenue de la Constitution 87
1083 Bruxelles, Belgique
info@septodont.be

septodont

www.septodont.be

Les prix affichés peuvent être modifiés à tout moment en fonction de l'évolution du marché ou des éventuelles erreurs d'impression. Editeur Responsable : Tom Preneel - Avenue de la Constitution 87 - B-1083 BRUXELLES